


Master theorem:

Nech $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, $T(1) = \Theta(1)$. Nech $k = \log_b a$. Potom:

1. Ak $f(n) \in O(n^{k-\varepsilon})$ pre niektoré $\varepsilon > 0$, potom $T(n) \in \Theta(n^k)$.
2. Ak $f(n) \in \Theta(n^k)$, potom $T(n) \in \Theta(f(n) \log n)$.
3. Ak $f(n) \in \Omega(n^{k+\varepsilon})$ pre niektoré $\varepsilon > 0$ a platí podmienka regularity, potom $T(n) \in \Theta(f(n))$.

Podmienka regularity: Existuje $c < 1$ také, že pre všetky dostatočne veľké n platí $af(n/b) \leq cf(n)$.



$$T(n) = \Theta(n^k) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$$

Prípád 1: $f(n) \in O(n^{k-\varepsilon}) = \text{“ťažký spodok”}$

$$\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j) =$$

Teda $\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j) = O(n^k) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^k)$

$$T(n) = \Theta(n^k) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$$

Prípad 2: $f(n) \in \Theta(n^k)$ = “vyvážené úrovne”

Chceme ukázať, že každá úroveň “prispeje” prácou $\Theta(n^k)$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^k \log n)$$

$$T(n) = \Theta(n^k) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$$

Prípád 3: $f(n) \in \Omega(n^{k+\varepsilon}) = \text{“ťažký vrch”}$

Podmienka regularity: $af(n/b) \leq cf(n) \Rightarrow a^j f(n/b^j) \leq c^j f(n)$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

Master theorem:

Nech $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, $T(1) = \Theta(1)$. Nech $k = \log_b a$. Potom:

1. Ak $f(n) \in O(n^{k-\varepsilon})$ pre niektoré $\varepsilon > 0$, potom $T(n) \in \Theta(n^k)$.
2. Ak $f(n) \in \Theta(n^k)$, potom $T(n) \in \Theta(f(n) \log n)$.
3. Ak $f(n) \in \Omega(n^{k+\varepsilon})$ pre niektoré $\varepsilon > 0$ a platí podmienka regularity, potom $T(n) \in \Theta(f(n))$.

Podmienka regularity: Existuje $c < 1$ také, že pre všetky dostatočne veľké n platí $af(n/b) \leq cf(n)$.

Najbližší pár bodov

Úloha: Daných je n bodov p_1, \dots, p_n ($p_i = (x_i, y_i)$)

Nájdite pár bodov, ktoré sú k sebe najbližšie (Euklidovská vzdialenosť)

Triviálne riešenie: Porovnaj $d(p_i, p_j)$ pre každý pár bodov

\Rightarrow čas $\Theta(n^2)$

Lepší nápad: rozdeľuj a panuj

- Rozdeľ vertikálnou čiarou na dve rovnaké polovice P_L a P_R
- Rekurzívne nájdí:
 - δ_L : najbližší pár v P_L
 - δ_R : najbližší pár v P_R
- Spočítaj δ_M : najbližší pár “cez čiaru”
- Výsledok je $\min\{\delta_L, \delta_R, \delta_M\}$

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^2) \text{ (master theorem)}$$

Šikovnejšie hľadanie bodov “cez čiaru”

Ak $\delta = \min\{\delta_L, \delta_R\}$, tak nás nezaujímajú body, ktoré sú od hranice ďalej ako δ !


```

function closest_pair(l,r)
    // Find the closest pair in P[l..r]
    // assume P[l..r] is sorted by x-coordinate
    if size(P)<2 then return infinity;
    // Divide: midx will be a dividing line
    mid:=(l+r)/2; midx:=P[mid].x;
    dl:=closest_pair(l,mid); dr:=closest_pair(mid+1,r);
    // as a side effect, P[l..mid] and P[mid+1..r]
    // are now sorted by y-coordinate
    delta:=min(dl,dr);
    QL:=select_candidates(l,mid,delta,midx);
    QR:=select_candidates(mid+1,r,delta,midx);
    dm:=delta_m(QL,QR,delta);
    // use merge make P[l..r] sorted by y-coordinate
    merge(l,mid,r);
    return min(dm,dl,dr);

```

```
function select_candidates(l,r,delta,midx)
  // From P[l..r] select all points which are
  // in the distance at most delta from midx line
  create empty array Q;
  for i:=l to r do
    if (abs(P[i].x-midx)<=delta)
      add P[i] to Q;
  return Q;
```

```

function delta_m(QL,QR,delta)
    // Are there two points p in QL, q in QR such that
    // d(p,q)<=delta? Return closest such pair.
    // Assume QL and QR are sorted by y coordinate
    j:=1; dm:=delta;
    for i:=1 to size(QL) do
        p:=QL[i];
        // find the bottom-most candidate from QR
        while (j<=n and QR[j].y<p.y-delta) do
            j:=j+1;
        // check all candidates from QR starting with j
        k:=j;
        while (k<=n and QR[k].y<=p.y+delta) do
            dm:=min(dm,d(p,QR[k]));
            k:=k+1;
    return dm;

```

```
//----- main -----  
// P contains all the points  
sort P by x-coordinate;  
return closest_pair(1,n);
```

Časová zložitosť: Nech $T(n)$ je čas potrebný na vyriešenie problému pre n bodov.

- Rozdeľuj: $\Theta(1)$
- Panuj: $2T(n/2)$
- Skombinuj: $\Theta(n)$

Teda $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$ (master theorem).